

Vejledende ækvivalensliste for sorter af majs

Bemærk, at "tidlighed/sildighed" som argument ikke kan stå alene.

Listen vil løbende blive opdateret i forhold til sortsegenskaber og tilgængelig økologiske sorter.

Version af 4. december 2023

	Sorter	Sortsegenskaber (Forårsvækst, fordøjelighed, udbytte mv.)	Økologisk sort med tilsvarende egenskaber	Bemærkninger
Meget tidlige	Cito KWS		Cito KWS	FAO tal baseret på danske forsøg på 140
	Debalto KWS			
	Reason			
	Duxxbury			
	Pirro			
	Neutrino			
Tidlige	Ambition			
	Autens KWS		Autens KWS	FAO tal baseret på danske forsøg på 170
	KWS Avitus			
	CS Prosperiti			
	Echo			
	Exelon		KWS Exelon	FAO tal baseret på danske forsøg på 160
	Saxon			
	Trooper			
	Wizard			
	KWS Calvini			
	Pinnacle		Pinnacle	
Venitia		Venitia	Ingen forsøg siden 2011	
Middeltidlige	Ability			
	Amaizi CS			
	Asgaard			
	Conclusion			
	Dignity			
	Faith			
	Function			
	Gatsby			
	KWS Pasco			
	KXB9009			
	LG30179			
	Mas 08.F			
	Papageno		Papageno	FAO tal baseret på danske forsøg på 180
	Resolute			
	Sandias			
	SB0159			
SY Karthoun				
SY Nordicstar				
SY Silverbull		SY Silverbull		

	Sorter	Sortsegenskaber (Forårsvækst, fordøjelighed, udbytte mv.)	Økologisk sort med tilsvarende egenskaber	Bemærkninger
Sildige	Emeleen		Emeleen	
	Farmodena			
	Farmunox			
	Kompetens			
	KWS Lazlo			
	KWS Salamandra			
	KWS Stefano			
	LG31205			
	LG31.207			
	LG31211			
	LG31218			
	SY Milkytop			
	SY Skandik			
	Movanna			
Øvrige	F7034			
	Pioneer			
	Prospect			
	Sandia			
	Sergio			
	Edgar			
	Activate			
	Benedictio		Benedictio	KWS sorten Benedictio har FAO tal 230 baseret på tyske tal og er ikke relevant for dyrkning i Danmark. Der er flere sorter på listen som ikke har været med i landsforsøgene og dermed ikke kan placeres i tidlighed – her er Benedictio en af dem.