

Metod	Bilaga 3.2
Kod	
1a	Normal odling på friland följt av naturlig vernalisering i fält. Vid behov skydd med halm eller fiberduk. Vitkål, rödkål och brysselkål bör övervintra under milda vintrar. Vid blomning placeras insektsäker isoleringstält över varje sort. Minst arbetskrävande metod men med störst risk för utebliven skörd.
1b	Normal odling på friland. När grödan nått skördefärdigt stadium grävs hela plantan upp och friplanteras i växthus alternativt odlas i stora krukor.
1c	Normal odling på friland. När grödan nått skördefärdigt stadium skärs huvudet av och plantan får stå kvar i fält. Efter 2-3 veckor har små sticklingar bildats i de kvarvarande bladvecken. Skotten skärs av och krukas i jord i växthus. Plantorna övervintras i kallväxthus och blir då vernaliserade. På våren planteras materialet i isoleringsburar på friland.
1d	Normal odling på friland. När grödan nått skördefärdigt stadium skärs huvudet av nära marken. Huvudet bladas försiktigt av så att hela den inre stocken friläggs. Skär bort bladen försiktigt med kniv. Stocken viras in i fuktigt hushållspapper och förvaras mörkt i kylskåpstemperatur, ca 4 grader. I januari-februari tas stocken fram och planteras rättvänd i jord i kruk. Materialet odlas i växthus, gärna vid 10-15 grader. Efter några veckor syns små skott spira. Plantera ut hela stocken i isoleringshus på friland när vädret tillåter.
2	Sådd i växthus på hösten (september-oktober). Fortsatt odling i krukor till det är dags att plantera i isoleringshus på friland när vädret tillåter.
erfarenhet	Enligt bästa erfarenhet från de första försöken